


## 安定ヨウ素剤に関するアンケート結果

昨年実施させて頂きました、安定ヨウ素剤に関するアンケート調査にご協力頂き、誠にありがとうございました。今回、アンケートの集計結果を報告させていただきます。765名の方にご協力いただき、526名の方の回答について解析させて頂きました。


母の年齢

30歳以上 ■ 30歳未満 ■




原発から居住地の距離

知っている ■ 知らない ■




安定ヨウ素剤に関する情報入手状況

入手できている ■ 入手できていない ■




これまでに、原子力災害に関する説明会に参加したことはあるか

ある ■ ない ■




現在、安定ヨウ素剤の配布を受けているか

受けている ■ 受けていない ■




今後、安定ヨウ素剤の配布希望の有無

希望する ■ 希望しない ■




安定ヨウ素剤に関する専門家への相談

希望する ■ 希望しない ■




安定ヨウ素剤の飲ませ方を知っているか（服用タイミングなど）

知っている ■ 知らない ■



ゼリーや丸剤の安定ヨウ素剤を正しく飲ませる自信の有無


自信ある ■ 自信ない ■



# 安定ヨウ素剤に関するアンケート結果


安定ヨウ素剤を子どもに内服させることに不安があるか

不安ある ■ 不安ない ■




安定ヨウ素剤を服用すれば避難は必要ないと思うか

必要ある ■ 必要ない ■



安定ヨウ素剤の効力持続期間


1日 ■ 1か月 ■ 1年 ■



■ 正解者 : 108 (20.5%)  
■ 不正解者 : 418 (79.5%)

安定ヨウ素剤を服用することで放射性セシウムによる内部被ばくを防ぐことができると思うか


思う ■ 思わない ■ わからない ■



■ 正解者 : 111 (21.1%)  
■ 不正解者 : 418 (78.9%)


現在の福島県に住むことで将来、子どもへの健康影響が起こるか

起こると思う ■ 起こらないと思う ■




福島県産の食材を食べることに抵抗があるか

ある ■ ない ■



福島県産の食材を子どもへ食べさせることに抵抗があるか

ある ■ ない ■



- 89.7%のお母さんが安定ヨウ素剤を子どもに内服させることへ不安があると回答されていました。
- ほとんどのお母さんは、原子力災害時には安定ヨウ素剤内服のみならず、避難も同様に実施することが必要だと正しく理解されていました。一方で、安定ヨウ素剤の服用時期・効果期間・効果については多くの方が理解できていないことが分かりました。

今回の結果は、原子力災害時の安定ヨウ素剤服用・管理体制をさらに良いものにするための重要な資料となりました。

この結果を参考に、今後、皆様の安定ヨウ素剤についての不安や疑問の解消に向けた情報の発信等をしていきたいと思っております。

ご不明な点がありましたらお問い合わせください。

多くの皆さまからご協力いただき、深くお礼申し上げます。

